

# SALVIT LAXAVIT

Medicinski pripomoček na osnovi makrogola z odvajalnim učinkom

**PAKIRANJE:** Salvit Laxavit vsebuje 16 vrečk. Vsaka vrečka s 6,5 g praška za peroralno uporabo vsebuje 5 g makrogola 3350.

**INDIKACIJE ZA UPORABO:** Salvit Laxavit je indiciran v primerih kroničnega zaprtja in nerednega praznjenja črevesja. Zahvaljujoč osmotskemu učinku makrogola 3350, ki ima visoko afiniteto za vezavo vode in mehčanje blata, pospešuje delovanje črevesja in lajša praznjenje črevesja na naraven način. V črevesju se ne absorbira niti, ne presnavlja, ne fermentira, ne draži sluznice in se v nespremenjeni obliki izloči z blatom.

**SESTAVA:** makrogol 3350, fruktoza, aroma, sredstvo proti strjevanju: silicijev dioksid.

**NAVODILA ZA UPORABO:** Vsebino ene vrečke raztopite v kozarcu (približno 120 ml) vode ali druge tekočine. Mešajte, dokler se popolnoma ne raztopi. Pripravljeno raztopino popijte. Število vrečk, ki jih je treba vzeti, lahko vnaprej pripravimo v ustrezni količini vode, pripravljeno raztopino pa moramo pokrito hraniti v hladilniku največ 24 ur. Neuporabljeno raztopino je treba zavreči. Salvit Laxavit je priporočljivo jemati med obroki. Izdelka Salvit Laxavit ni priporočljivo jemati z zdravili, saj Salvit Laxavit pospešuje delovanje črevesja in lahko negativno vpliva na učinkovitost zdravil. Če jemljete druga zdravila, se pred jemanjem izdelka Salvit Laxavit posvetujte z zdravnikom.

## ODMERJANJE:

### Odmerjanje in navodila za uporabo v primeru zaprtja:

Od 6. meseca do 2. leta starosti: 1/2–2 vrečki na dan

Od 2. do 4. leta starosti: 2–3 vrečke na dan

Od 5. leta starosti: 3–4 vrečke na dan

Jemljite največ 5 dni.

### Odmerjanje in navodila za uporabo v primeru dolgotrajnega zaprtja:

Od 6. meseca do 2. leta starosti: 1/2–1 vrečka na dan

Od 2. do 4. leta starosti: 1 vrečka na dan

Od 5. leta starosti: 2 vrečki na dan

Jemljite največ 28 dni.

Po 28 dneh jemanje prekinite in se posvetujte z zdravnikom.

Ne prekoračite največjega odmerka 4 vrečke na dan.

## PREDOZIRANJE:

Ne prekoračite priporočenega odmerka. V primeru prevelikega odmerjanja se lahko pojavi draženje želodca in črevesja, kot so bolečine v trebuhu in driska. Zaradi prekomernega praznjenja črevesja lahko pride do dehidracije in izgube elektrolitov. V primeru suma na preveliko odmerjanje se takoj obrnite na pediatra svojega otroka ali zdravnika.

**STRANSKI UČINKI:** Prebavne reakcije, kot so: driska ali odsotnost blata, bolečine v trebuhu, napihnjenost, draženje in vnetje analnega predela, napenjanje, zrak v črevesju, slabost, bruhanje, se lahko pojavijo zaradi večje gibljivosti in osmotskega učinka makrogola 3350.

Če se odmerek zmanjša ali odloži, se ti učinki lahko zmanjšajo in/ali odpravijo. Če se v redkih primerih pojavijo reakcije preobčutljivosti, kot so kožni izpuščaji, srbenje, urtikarija, takoj prenehajte uporabljati izdelek in obvestite svojega zdravnika.

**MEDESEBOJNO DELOVANJE:**

Salvit Laxavit vzemite najmanj 2 uri po tem, ko ste vzeli zdravila, saj pospešuje delovanje črevesja, kar lahko negativno vpliva na učinkovitost zdravil.

Če imate druge terapije, zlasti zdravljenje s kortizonom, se pred jemanjem izdelka Salvit Laxavit posvetujte z zdravnikom.

**KONTRAINDIKACIJE:** Ne uporabljajte izdelka Salvit Laxavit v primeru preobčutljivosti za eno ali več sestavin. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 mesecev.



**OPOZORILA:** Hraniti izven dosega otrok. Pri dojenčkih in otrocih, mlajših od 2 let, izdelek uporabljajte le po posvetu z zdravnikom.

Nosečnost in dojenje: jemljite le pod zdravniškim nadzorom. Izogibajte se stiku z očmi. V primeru stika z očmi izperite z vodo. Izdelka Salvit Laxavit ne uporabljajte v primeru preobčutljivosti na makrogol 3350 in v primeru lezije želodca ali prebavil, obstrukcije ali perforacije, Crohnove bolezni, ulceroznega kolitisa in drugih vnetnih boleznih prebavil. Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabnosti, ki je naveden na embalaži in vrečki. Izdelka ne uporabljajte v primeru, če je embalaža poškodovana. Ne vzemite vrečke, ki je bila delno uporabljena in odprta daljše časovno obdobje, saj v tem primeru učinkovitost in mikrobiološke lastnosti izdelka niso zagotovljene. Izogibajte se nepravilni uporabi izdelka. Ne odlagajte posode ali embalaže v okolje.

**SKLADIŠČENJE:** Shranjujte na hladnem in suhem mestu, stran od vira toplote. Datum poteka roka uporabe se nanaša na neodprti izdelek, ki je bil pravilno shranjen.

Datum izdaje navodil za uporabo: 04.06.2020.



4003080



**INPHARMA SpA**  
Viale Liguria 20/22 – 20143 Milano



**Proizvedeno za:** Salvus d.o.o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvaška, **Država porekla:** Italija  
**Uvoznik in distributer za Republiko Hrvaško:** Salvus, d. o. o., Toplička cesta 100, 49240 Donja Stubica, Hrvaška, **Tel.:** +385 (0)49/326 550, **E-pošta:** info@salvushealth.com, **Spletna stran:** www.salvushealth.com,  
**Dobavitelj za Slovenijo:** SALVUS MED d.o.o., Jakšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana, **Tel.:** +386 51 221 638, **E-pošta:** info@salvushealth.com, **Spletna stran:** www.salvushealth.com