

Defendyl®

Imunoglukan P4H®



Navodilo za uporabo Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

**Prehransko dopolnilo v tekoči obliki,
ki vsebuje naravni IMG® in vitamin C.
Vitamin C ima vlogo pri delovanju
imunskega sistema.**

Sestavine:

voda, fruktoza, IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), vitamin C, (L-askorbinska kislina), sredstvo za uravnavanje kislosti (citronska kislina), konzervans (kalijev sorbat)
Energijska vrednost v 1 ml: 0,3 kcal/1,3 kJ

Lastnosti:

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

vsebuje naravni polisaharid IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), izoliran iz gobe bukov ostrigar (*Pleurotus ostreatus*) in vitamin C. Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primeren tudi za diabetike in vegetarijance.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

ne vsebuje glutena in laktoze.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je namenjen otrokom in odraslim, ki jim bolj ustreza prehransko dopolnilo v tekoči obliki.

Priporočeni dnevni odmerek in način uporabe:

| | Telesna masa [kg] | Priporočena količina [ml] | IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan) [mg] | Vitamin C [mg] |
|---------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Oroci | 15 | 3 | 30 | 30 (38 % PDV/RDA) |
| | 20 | 4 | 40 | 40 (50 % PDV/RDA) |
| | 25 | 5 | 50 | 50 (63 % PDV/RDA) |
| | 30 | 6 | 60 | 60 (75 % PDV/RDA) |
| Odrasli | 70 | 14 | 140 | 140 (175 % PDV/RDA) |

PDV/RDA (priporočeni dnevni vnos)

Opozorila: Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smejo jemati bolniki s presajenimi organi. Bolniki, ki prejemajo imunosupresivno zdravljenje, lahko jemljejo Defendyl-Imunoglukan P4H® junior le po posvetu z zdravnikom. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Pomembna sta raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja.

Defendyl®

Imunoglukan P4H®



Uputa za upotrebu Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

**Tekući dodatak prehrani koji sadrži prirodnji IMG® i vitamin C.
Vitamin C doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.**

Sastojci:

voda, fruktoza, IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan, vitamin C, (L-askorbatna kiselina), regulator kiselosti: limunska kiselina, konzervans: kalijev sorbat Energetska vrijednost u 1 ml: 0,3 kcal/1,3 kJ

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior

sadrži prirođeni polisaharid IMG® (beta-(1,3/1,6)-D-glukan), izoliran iz gljive bukovače (*Pleurotus ostreatus*) i vitamin C, koji doprinosi normalnoj funkciji imunološkog sustava.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je primijeren za dijabetičare i vegetarijance.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne sadrži gluten i laktuzu.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior je namijenjen za djecu i odrasle kojima više odgovara dodatak prehrani u tekućem obliku.

Kao pomoć funkciji imunološkog sustava, uzimajte 1 ml tekućine/5 kg tjelesne mase jedanput na dan, kroz 2 do 3 mjeseca. Kod povećanih potreba preporučuje se uzimanje dvostrukе doze u prvi pet dana.

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior možete uzimati neprekidno kroz 6 mjeseci. Tekućinu je potrebno uzimati na prazan želudac ujutro ili navečer prije spavanja. Prije upotrebe bočicu je potrebno dobro protresti.

Čuvanje:

Čuvati od dohvata male djece!

Čuvati pri temperaturi od 5 do 25 °C, zaštićeno od vlage i direktnog sunčeva svjetlosti. Nakon prvog otvaranja čuvati proizvod u hladnjaku pri temperaturi od 2 do 8 °C te ga upotrijebiti u roku od tri mjeseca. U tekućini se mogu pojaviti bijeli kristali koji ne utječu na kakvoću proizvoda.

Pakiranje:

Bočica, 120 ml ili 250 ml

Preporučena dnevna doza i način uporabe:

| | Tjelesna masa (kg) | Preporučena količina (ml) | IMG® [beta-(1,3/1,6)-D-glukan] (mg) | Vitamin C (mg) |
|---------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Djeca | 15 | 3 | 30 | 30 (38 % PU) |
| | 20 | 4 | 40 | 40 (50 % PU) |
| | 25 | 5 | 50 | 50 (63 % PU) |
| | 30 | 6 | 60 | 60 (75 % PU) |
| Odrasli | 70 | 14 | 140 | 140 (175 % PU) |

PU (preporučeni unos)

Upozorenje:

Defendyl-Imunoglukan P4H® junior ne smiju koristiti bolesnici sa presadenim organima. Bolesnici koji su na terapiji imunosupresivima mogu uzimati **Defendyl-Imunoglukan P4H® junior** samo nakon savjetovanja s liječnikom. Preporučene dnevne doze ne smiju se prekoracići. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani.